

- ب) ♠ استنتج حلول المعادلة (E) [2]  
♦ ليكن  $n$  عدداً طبيعياً غير معدوم . نضع :  
 $b = 11n + 4$  و  $a = 5n + 2$
- أ) ♠ عين القيم الممكنة للقاسم المشترك للعددين  $a$  و  $b$   
 $PGCD(a; b) = 2$
- ب) ♠ عين قيم  $n$  بحيث يكون  $a$  و  $b$  أوليين فيما بينها .
- ج) ♠ استنتج قيم  $n$  بحيث يكون العددان  $a$  و  $b$  أوليين فيما بينها .
- أ) ♠ أدرس حسب قيم العدد الطبيعي غير المعدوم  $n$  بباقي القسمة الأقلية للعدد  $2^n$  على 10  
 $2^{2016}$
- ب) ♠ استنتاج رقم أحد العدد  $2^{y-2x}$  وتحقق : [10]
- ج) ♠ عين كل الثنائيات  $(x; y)$  من  $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$  التي هي حلول المعادلة (E)

## التمرين 6:

- ♠ تعتبر المعادلة (1)  $3x - 4y + 5 = 0$  حيث  $x$  و  $y$  مجهولان طبيعيان [1] ♦ عين تبعاً لقيم العدد الطبيعي  $n$  باقي قسمة 7 على 5
- [2] ♦ بين أنه مهما كان  $n$  من  $N$  فإن :  $(1 + 2010 + 7^{2010})$  يقبل القسمة على 5.
- [3] ♦ من أجل  $2 = y$ ، استنتاج حلاء خاصاً لـ (1)، ثم جد جميع حلولها  $N^2$  في  $(x; y)$
- [4] ♦ إذا كان  $(x; y)$  حل لـ (1)، فهو باقي قسمة العدد  $7^{x+3}$  على 5

## التمرين 7:

- ♠ تذكر : من أجل كل عددين  $a$  و  $b$  نقول أن  $a$  يوافق  $b$  بتزدید 7 ونكتب  $a = b + 7k$  حيث  $k \in \mathbb{Z}$
- [1] ♦ سؤال من الدرس :
- أ) ♠ لتكن  $a, b, c$  و  $d$  أعداد صحيحة . أثبت أنه إذا كان :  
 $ac \equiv bd$  [7] و  $a \equiv b$  [7]
- ب) ♠ استنتاج أنه من أجل كل عددين صحيحين غير معدومين  $a$  و  $b$  :  
 $a^n \equiv b^n$  [7] إذا  $a \equiv b$  [7] فإنه من أجل عدد طبيعي  $n$ :
- [2] ♦ من أجل  $2 = a$  ثم من أجل  $3 = a$  أوجد عدد طبيعي  $n$  غير معدوم يتحقق :  $a^n \equiv 1$  [7]
- أ) ♠ ليكن  $a$  عدد طبيعي لا يقبل القسمة على 7 أثبت أن  $a^6 \equiv 1$  [7]
- ب) ♠ حدد أصغر عدد طبيعي غير معدوم  $k$  يتحقق  $a^k \equiv 1$  [7]
- من أجل  $2 \leq a$
- ج) ♠ من أجل كل عدد طبيعي  $n$  نضع :  
 $A_{2011} \equiv 6$  [7] بين أن :  $A_n = 2^n + 3^n + 4^n + 5^n + 6^n$

## التمرين 1:

- لتكن (E) مجموعة الثنائيات  $(x; y)$  من  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  حيث :  
[1] ♦ عين الثنائية  $(x_0; y_0)$  من (E) والتي تحقق  $2x_0^2 - 3y_0 = 11$
- [2] ♦ حل في  $\mathbb{Z}^2$  المعادلة  $11x + 3y = 65$
- [3] ♦ عين الثنائيات  $(x; y)$  من (E) حيث  $-5 < x < 5$  و  $-5 < y < 5$

## التمرين 2:

- ♠ تعتبر في المجموعة  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  المعادلة : (1) .....  $8x - 6y = 22$
- [1] ♦ بين أن المعادلة (1) تقبل حلولاً في  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
- [2] ♦ عين حلاء خاصاً  $(x_0; y_0)$  للمعادلة (1) والذي تتحقق  $x_0 - y_0 = 3$
- [2] ♦ حل في المجموعة  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  للمعادلة (1)
- ♣ تعتبر  $a$  و  $b$  عددان طبيعيان حيث (a; b) حل للمعادلة (1)  
 $pgcd(a; b) = d$  نضع
- [1] ♦ عين القيم الممكنة لـ  $d$
- [2] ♦ عين الثنائيات  $(a; b)$  التي تتحقق المعادلة (1) و  $11 \mid pgcd(a; b)$

## التمرين 3:

- ♦ حل العدد 320 إلى جداء عوامله الأولية ثم عين قواسمه الطبيعية . [1]
- [2] ♦ عددان طبيعيان أوليان فيما بينهما . أثبت أن  $xy$  و  $(x+y)$  أوليان فيما بينهما .
- [3] ♦ عددان طبيعيان غير معدومين بحيث :  $7(a+b)^2 = 320m$  حيث  $m = PPCM(a; b)$ . عين القيم الممكنة للعددين  $a$  و  $b$

## التمرين 4:

- ♦ حل المعادلة : (1) .....  $6x + 2y - 18 = 0$  ذات المجهولين  $x$  و  $y$
- [2] ♦ ماهي كل الثنائيات  $(x; y)$  حلول المعادلة السابقة حيث  $x$  و  $y$  طبيعيان معاً؟
- [3] ♦ نفرض الأن أن  $y$  طبيعي ، ولا يهمنا  $x$ .  
بين أن :  $7 \mid 2011^y - 1 \equiv 0$  [7]
- [3] ♦ أعداد طبيعية غير معدومة ، حيث يكتب  $y$  في النظام ذي الأساس 5 هكذا:  $4\alpha 0$  وفي النظام ذي الأساس 4 هكذا:  $1\alpha\beta\alpha$   
أكتب كل القيم الممكنة لـ  $y$  في النظام العشري .

## التمرين 5:

- ♠ تعتبر المعادلة (E) ذات المجهولين الصحيحين  $x$  و  $y$  حيث :  
 $11x - 5y = 2$
- [1] ♦ أثبت أنه إذا كانت الثنائية  $(x; y)$  من  $\mathbb{Z}^2$  حل للمعادلة (E)  
فإن :  $y \equiv 4$  [7]

## التمرين 11:

(1) متتالية معرفة على بن  $U_0 = 0$ ،  $U_1 = 1$  ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$ :  $U_{n+2} = 5U_{n+1} - 4U_n$  .  
أحسب  $U_2$  و  $U_3$ . [1]

[2] برهن بالترافق من أجل كل عدد طبيعي  $n$  أن :

$$U_{n+1} = 4U_n + 1$$

تحقق أن :  $U_n$  عدد طبيعي ، ثم استنتج أن :  $U_n$  و  $U_{n+1}$  أوليان فيما بينهما .

$$V_n = U_n + \frac{1}{3} \quad [3]$$

(أ) بين أن المتتالية  $(V_n)$  هندسية ، عين أساسها و حدها الأول .

$$(B) \text{ أكتب } V_n \text{ ثم بدلاة } n.$$

$$PGCD((4^6 - 1); (4^5 - 1)) \quad [4]$$

(ب) أحسب  $n$  عين من أجل كل عدد طبيعي :

$$PGCD((4^{n+1} - 1); (4^n - 1))$$

(أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  بواقي قسمة العدد  $4^n$  على 7.

(ب) أحسب بدلاة  $n$  المجموع  $S_n$  حيث :

$$S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_{3n}$$

(ج) عين قيم العدد الطبيعي  $n$  حيث العدد  $9S_n + 8n$  يقبل القسمة على 7

## التمرين 12:

(أ)  $\alpha$  و  $\beta$  عدادان طبيعيان أوليان في ما بينهما .

[1] عين  $\alpha$  و  $\beta$  علينا أن:  $35\beta = 35\alpha^2 - 19$  و  $\alpha > \beta$

[2] لتكن المتتالية الهندسية  $(U_n)$  التي حدها الأول  $U_0$  وأساسها  $q$  حيث

$$U_0 < q \text{ و } q \text{ أوليان فيما بينهما و } q < U_0$$

[أ] أوجد  $U_0$  و  $q$  حيث يكون :  $35U_0^2 + 19U_1 - U_0q^3 = 0$

نفرض في مالي :  $q = 6$  و  $U_0 = 7$

(أ) أحسب بدلاة  $n$  المجموع  $S_n$  حيث :

$$S_n = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

(ب) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  بواقي قسمة الأقلية العدد

$$S_n \equiv 0[30] \text{ على 5. استنتاج قيم } n \text{ حيث :}$$

## التمرين 13:

(1) في مجموعة الأعداد الصحيحة  $\mathbb{Z}$  نعتبر المعادلة  $6x - 9y + 15 = 0$  هل تقبل (1) حلولا في  $\mathbb{Z}^2$  ؟

[1] لاحظ أن :  $-2 - 3 = -5$  ، واستنتاج حالا خاصا ل (1)

[2] حل (1) في  $\mathbb{Z}^2$

[3] لتكن  $(x; y)$  حلول (1) الطبيعية ، ونضع :

$$L = 1432^x - 2 \times 2011^{3y}$$

أدرس بواقي قسمة كل من  $2^n$  ،  $4^n$  على 7 حسب قيم العدد

الطبيعي  $n$  ، ثم بين أن  $L \equiv 0[7]$

## التمرين 8:

[1] (أ) عين الثنائيات  $(x; y)$  من الأعداد الصحيحة حلول المعادلة  $8x - 5y = 3$  :  $(E)$

(ب) ليكن  $m$  عدد صحيح بحيث يوجد عددان صحيحان  $(p; q)$  يحققان :

- بين أن الثنائية  $(p; q)$  حل للمعادلة  $(E)$  واستنتاج أن  $m \equiv 9[40]$

(ج) عين أصغر عدد صحيح  $m$  أكبر من 200

ليكن  $n$  عدد طبيعي

[2] (أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $k$  لدينا  $2^{3k} \equiv 1[7]$

(ب) ماهو باقي القسمة الإقليدية للعدد  $1437^{2016}$  على 7

[3] ليكن  $a$  و  $b$  عدادان طبيعيان كلاهما أصغر من 9 مع  $a \neq 0$

نعتبر العدد  $N$  حيث  $N = a \times 10^3 + b$

نذكر أن  $N$  يكتب في النظام العشري :

(ج) نريد تعين الأعداد الطبيعية  $N$  التي تقبل القسمة على 7

- تتحقق أن  $7[1] - 10^3 \equiv 9$  ثم استنتاج كل الأعداد المطلوبة

## التمرين 9:

[1] (أ) جد جميع الثنائيات المرتبة  $(x; y)$  من الأعداد الطبيعية حيث

$$x^3 - y^3 = 631$$

[2] (أ) ماهو باقي القسمة الإقليدية للعدد 111 على 7

(ب) عين حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  بواقي القسمة الإقليدية

للعدد  $10^n$  على 7

(ج) عدد طبيعي يكتب في النظام العشري كالتالي :

$$\alpha = 999888777666555444333222111$$

(أ) بين أن  $\alpha$  يكتب بدلاة العدد 111.

(ب) ماهو باقي قسمة العدد  $\alpha$  على 7

## التمرين 10:

[1] (أ) أدرس حسب قيم  $n$  الطبيعية بواقي قسمة العدد :  $3^n$  على 10 .

(ب) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :

$$2013^{16n+2} - 2 \times 10^{8n+1} - 11 \equiv 0[10]$$

[3] (أ) عين الأعداد الطبيعية  $n$  حيث :  $7 \times 3^{n+1} - 1 \equiv 0[10]$

و  $10 < n \leq 25$

[4] ليكن العدد  $A$  مكتوب  $xx02102$  في النظام ذي الأساس 3

ومكتوب  $y67y$  في النظام ذي الأساس 9

(أ) عين  $x$  و  $y$

(ب) أكتب  $A$  في النظام العشري

(ج) أكتب  $A$  في النظام ذي الأساس 7

## التمرين 14:

- [2] ♦ عين قيم العدد الطبيعي  $n$  بحيث يكون العدد  $5^{6n+3} - 5^{6n+4} + 4n^2 + 1$  قابلاً للقسمة على العدد 7.
- [3] ♦ عدد طبيعي يكتب  $\overline{1xx0}$  في النظام ذي الأساس 5 حيث  $x$  عدد طبيعي .  
أ) ♠ عين قيم  $x$  حتى يكون العدد  $N$  قابلاً للقسمة على 35.  
ب) ♠ أكتب  $N$  في النظام العشري

## التمرين 18:

- [1] ♦ عين الأعداد الصحيحة  $x$  التي تتحقق :  $x^2 - x + 6 \equiv 0 [9]$
- [2] ♦ أدرس تبعاً لقيم العدد الطبيعي  $n$  باقي القسمة الأقلية للعدد  $7^{2n}$  على 9 ثم بين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ :  $7^{2n} \equiv 4^n [9]$   
ب) ♠ استنتج تبعاً لقيم  $n$  باقي القسمة الأقلية  $7^n$  على 9
- [3] ♦ ما هو باقي قسمة العدد  $9^{2017} + 25^{2018}$  على 9  
ب) ♠ عين الأعداد الطبيعية  $n$  التي يكون من أجلها العدد :  $7^{2n} - 7^n + 6$   
[4] ♦ عين الثنائيات  $(x, y)$  من الأعداد الطبيعية بحيث :  $7^x + 4^y \equiv 2 [9]$

## التمرين 19:

- $\alpha(n) = 9^n + 13^n$  حيث :  
[1] ♦ أوجد باقي قسمة العددين  $9^n$  و  $13^n$  على 7. ثم استنتج باقي قسمة العددين (2008) و  $\alpha(1429)$  على 7  
[2] ♦ حل في  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  المعادلة  $219x - 146y = 73$   
[3] ♦ حل في  $\mathbb{Z}$  الجملة التالية  
$$\begin{cases} x \equiv 0 [3] \\ x \equiv 1 [2] \end{cases}$$
  
[4] ♦ عين قيم العدد الطبيعي  $n$  التي يكون من أجلها  $\alpha(n)$  مضاعف لـ 7

## التمرين 20:

- [1] ♦ أدرس حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  باقي القسمة العدد  $2^n$  على 5  
[2] ♦ عين باقي القسمة الأقلية للعدد  $(2017^{4n+3} - 2 \times 2016^{2n+1})$  على 5.  
[3] ♦ بين أن العدد 131 أولي  
[4] ♦ عين الأعداد الطبيعية  $n$  التي تتحقق :  
$$\begin{cases} 3m + 7d = 2^n - 48 \\ ab = 5m \end{cases}$$
 حيث  $m = PPCM(a, b)$  و  $d = PGCD(a, b)$   
[5] ♦ عين قيم  $n$  بحيث يكون :  $7 < n < 15$   $\alpha(n)$  ثم استنتاج الثنائيات  $(a, b)$ .

## التمرين 15:

- [I] ♦ نعتبر في  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  المعادلة : (E) ...  
[1] ♦ بين أن المعادلة (E) تقبل حلولاً في  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$   
[2] ♦ بين أن المعادلة (E) تكافع المعادلة :  
[3] ♦ جد حل خاصاً  $(x_0; y_0)$  للمعادلة (E) حيث  
$$x_0 \geq 0 \quad x_0^2 + 480y_0 = 969$$
  
[4] ♦ حل في  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  للمعادلة (E)  
[5] ♦ عين قيم العدد الصحيح  $\lambda$  التي تتحقق الجملة (S) حيث :  
$$(S) \dots \begin{cases} \lambda \equiv -59 [673] \\ \lambda \equiv 1000 [480] \end{cases}$$

## التمرين 16:

- ♦ نعتبر المعادلة (1)  $4x - 13y = 7$  حيث  $x$  و  $y$  عدادان صحيحان  
[1] ♦ عين الحل الخاص  $(x_0; y_0)$  للمعادلة (1) الذي يتحقق  $x_0 - y_0 = 4$   
[2] ♦ حل المعادلة (1)  
[3] ♦ ليكن  $d$  القاسم المشترك الأكبر للعددين الطبيعيين  $x$  و  $y$ .  
أ) ♦ ماهي القيم الممكنة للعدد  $d$  إذا كان  $(x; y)$  حل للمعادلة (1)  
ب) ♦ عين الثنائيات  $(x; y)$  من الأعداد الطبيعية حلول المعادلة (1) بحيث يكون  $7 = d$ .  
ج) ♦ عين الثنائيات  $(x; y)$  من الأعداد الطبيعية حلول المعادلة (1)  
$$\begin{cases} d = 7 \\ x + y < 400 \end{cases}$$

## التمرين 17:

- [1] ♦ أدرس حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  باقي قسمة العدد :  $5^n$  على 7