

على المترشح ان يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول

التمرين الأول(3ن) أجب عن الأسئلة الآتية المستقلة عن بعضها البعض

1) اوجد العبارة الخطية للدالة  $f(x) = \cos^5 x$  ثم استنتج دالتها الأصلية

$$H \text{ التي تحقق } H(\pi) = 16 \text{ (توجيه استعمال نشر } \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}\right)^5$$

2) الفضاء منسوب الى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

احسب اصغر بمسافة بين المستقيمين  $(\Gamma)$  و  $(\mathcal{L})$  بحيث

$$(\Gamma) \begin{cases} x = -2t - 1 \\ y = 3t + 2 \\ z = 2 \end{cases} ; t \in \mathbb{R} \quad (\mathcal{L}) \begin{cases} x = \alpha + 1 \\ y = -\alpha \\ z = 1 \end{cases} ; \alpha \in \mathbb{R}$$

$$3) \text{ بين صحة المساواة } S_n = \sum_{k=1}^n \frac{4k}{4k^4+1} = 1 - \frac{1}{2n^2+2n+1}$$

$$(\text{استعمل } (4a^4 + b^4 = (2a^2 + 2ab + b^2)(2a^2 - 2ab + b^2))$$

التمرين الثاني(5ن)

$$w_n = \int_1^e (\ln x)^n dx \quad \text{لتكن المتتالية } (w_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ المعرفة كما يلي}$$

حيث  $e$  يرمز الى اساس اللوغاريتم النبيري

(1) احسب  $w_1$

باستعمال التكامل بالتجزئة بين أن  $w_n = e - nw_{n-1}$

(2) لتكن المتتالية  $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  بحيث  $w_n = (-1)^n (e\varphi_n - n!)$

عبر عن  $\varphi_{n+1}$  بدلالة  $\varphi_n$  واستنتج أن حدود المتتالية  $(\varphi_n)$  طبيعية

برهن بالتراجع من اجل  $n \in \mathbb{N}^*$  أن  $n - 1 \leq \varphi_n$

(3) بين ان المتتالية  $(L_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  المعرفة كما يلي  $L_n = \frac{1}{n! \varphi_{n+1}}$  متقاربة

التمرين الثالث (5)

(I) حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $\frac{\sqrt{2}z}{2} = \sqrt{z-2}$

استنتج حلول المعادلة  $(\bar{z} + 2 + 2\sqrt{3}i)^2 - 2\bar{z} = 4\sqrt{3}i$  حيث  $\bar{z}$  هو مرافق  $z$

(II) المستوي منسوب الى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j})$   $A, B, C, D$  نقط ذات اللواحق على

الترتيب  $z_D = -1 + 3\sqrt{3}i, z_C = -1 + \sqrt{3}i, z_B = 1 - \sqrt{3}i, z_A = 1 + \sqrt{3}i$

أوجد زاوية و نسبته التشابه المباشر  $\mathcal{S}$  الذي مركزه  $B$  ويحول  $C$  إلى  $A$  ثم اعط عبارته المركبة

عين إحداثيات  $\tilde{D}$  صورة  $D$  بالتشابه  $\mathcal{S}$  ثم إستنتج أن المثلثين  $BCD$  و  $BAD$  متشابهين

نعتبر التحويل النقطي  $\Phi$  الذي يرفق بكل نقطة  $M(z)$  النقطة  $M'(z')$  بحيث

$$2z' = 2(-i \cos(\pi/6) + \sin(\pi/6))z - 1$$

عين طبيعة التحويل  $\Phi$  وعناصره المميزة

عين العبارة المركبة للتحويل  $\Phi \circ \mathcal{S}$

عين طبيعة مجموعة النقط  $M$  من المستوي  $(\Gamma)$  بحيث  $(\Gamma): 2(Z + \bar{Z}) + Z\bar{Z} = 0$

عين صورة المجموعة  $(\Gamma)$  بالتحويل  $\Phi \circ S$

### التمرين الرابع (7ن)

(I) نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على المجموعة  $\mathbb{R}$  كما يلي  $f(x) = (1 - 2x)e^{2x}$

نسمي  $(C_f)$  منحناها البياني في المعلم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  وحدة الطول  $2cm$

أدرس تغيرات الدالة  $f$  شكل جدول تغيراتها ثم أنشئ  $(C_f)$  في المعلم السابق

ناقش حسب قيم  $m$  عدد و اشارة حلول المعادلة  $f(x) = f(m)$  حيث  $m$  و سيط حقيقي

أحسب ب  $2cm$  و بدلالة  $\lambda$  المساحة  $S(\lambda)$  لحيز المستوي المحدد بالمنحني  $(C_f)$

و المستقيمت التي معادلاتها  $y = 0$  و  $x = \frac{1}{2}$  و  $x = \lambda$  بحيث  $\lambda < \frac{1}{2}$  ثم أحسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} S(\lambda)$

(II)

احسب المشتقات المتتابعة  $f^{(n)}$  للدالة  $f$  حتى الرتبة 4 من اجل كل عدد طبيعي غير معدوم  $n$

أوجد تخمينا للعبارة العامة ل  $f^{(n)}$  ثم برهن بالتراجع هذا التخمين

أستنتج حلول المعادلة التفاضلية  $y'' = 8(-2 - 2x)e^{2x}$

(III)

من اجل كل عدد طبيعي غير معدوم  $n$  المنحني  $(C_{f^{(n)}})$  الممثل للدالة  $f^{(n)}$  يقبل مماس يوازي

حامل محور الفواصل في النقطة  $M_n(x_n, y_n)$  احسب بدلالة  $n$  كلا من  $x_n$  و  $y_n$

بين أن المتتالية  $(x_n)$  حسابية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول  
أحسب  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

أحسب  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$

بين أن المتتالية  $(y_n)$  هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول

## الموضوع الثاني

التمرين الأول(3ن) أجب عن الأسئلة الآتية المستقلة عن بعضها البعض

(1) نعتبر المعادلة التفاضلية  $(E)$  بحيث  $y'' - 2y' + y = 4e^x$  بين ان الدالة  $\psi$

بحيث  $\psi(x) = (2x^2 - 3x)e^x$  هي حل ل  $(E)$  وأستنتج دالة أصلية لدالة  $\psi$

(2) المستوي منسوب الى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  ولتكن النقطة  $M(z)$  ذات

عين مجموعة النقط من المستوي ذات اللاحقة  $z$  التي تحقق

$$\arg(\bar{z} - 2i)^2 - \arg(2\bar{z} - 4i)^2 + \arg(i + 1) = \frac{\pi}{7}$$

(3) من أجل كل عدد طبيعي  $n$  نضع  $A_n = 2^n + 3^n + 4^n + 5^n + 6^n$

بين انه اذا كان  $n$  فرديا فإن  $A_{n+1}$  يقبل القسمة على 7

## التمرين الثاني(5ن)

الفضاء منسوب الى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  و  $\alpha$  عدد حقيقي من المجال  $]0, \pi[$

لتكن  $(S_\alpha)$  مجموعة النقط  $M(x, y, z)$  التي تحقق

$$(S_\alpha): OM^2 - 2 \cos(\alpha) [\overrightarrow{OM} \cdot (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})] + 3 - 4 \sin^2(\alpha) = 0$$

1) اعط معادلة ديكرتية ل  $(S_\alpha)$

(2) بين ان  $(S_\alpha)$  هي سطح كرة يطلب تعيين مركزها  $I_\alpha$  و نصف وقطرها  $R_\alpha$

استنتج مجموعة النقط  $I_\alpha$  عندما يسمح  $\alpha$  المجال  $]0, \pi[$

(3) عين سطوح الكرات  $(S_\alpha)$  التي تمر بالمبدأ  $O$

بين أن  $O$  منتصف القطعة  $[I_{\pi-\alpha}I_{\alpha}]$

استنتج أن  $(S_{\pi-\alpha})$  و  $(S_{\alpha})$  متناظران بالنسبة إلى  $O$

(4) ليكن المستوي  $(P)$  ذو المعادلة  $x + y + z = 0$

عين احداثيات النقطة  $H$  المسقط العمودي للنقطة  $I_{\alpha}$  على  $(P)$  ثم ادرس  $(P)$  و  $(S_{\alpha})$

### التمرين الثالث(4ن)

1- أدرس حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  باقي قسمة  $2^n$  على 5

استنتج باقي القسمة الاقليدية ل  $(2017^{4n+3} - 2 \times 2016^{8n} + 2014^{2n+1})$  على 5

2- بين ان العدد 131 اولي

3- عين الأعداد الطبيعية  $n$  التي تحقق

$$\begin{cases} 3m + 7d = 2^n - 8 \\ ab = 5m \end{cases}$$

حيث  $d=PGCD(a, b)$  و  $m=PPCM(a, b)$

4- عين قيم يكون  $7 < n < 15$  ثم استنتج الثنائيات  $(a, b)$

### التمرين الرابع(8ن)

(I) نعتبر الدالة العددية  $f_n$  المعرفة على  $]0, +\infty[$  كما يلي  $f_n(x) = \frac{(\ln x)^n}{x^2}$

نسمي  $(C_{f_n})$  منحناها البياني في المعلم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  ( $n$  عدد طبيعي غير معدوم)

أدرس تغيرات  $f_1$  ثم عين معادلة المماس  $(T)$  للمنحني  $(C_{f_1})$  في النقطة ذات الفاصلة 1

بين ان جميع المنحنيات  $(C_{f_n})$  تشترك في نقطتين ثابتين عينهما

أدرس اتجاه تغيرات الدالة  $f_n$  في حالة  $n$  فردي ثم في حالة  $n$  زوجي ثم شكل جدولين لتغيراتها

أنشئ  $(C_{f_1})$  و  $(C_{f_2})$

$$\varphi_n = \int_1^e f_n(x) dx \quad (\text{II}) \quad \text{متتالية عددية معرفة ب}$$

$$\varphi_{n+1} = -\frac{1}{e} + (n+1)\varphi_n \quad \text{ثم بين أن}$$

احسب  $\varphi_2$  استنتج مساحة الحيز من المستوي المحدد ب  $(C_{f_1})$  و  $(C_{f_2})$  والمستقيمن ذي المعادلتين

$$x=e \text{ و } x=1$$

**(III)**

$$\mathcal{W}_n = \int_1^{e^2} f_n(x) dx \quad \text{نعتبر الان } (\mathcal{W}_n) \text{ متتالية عددية معرفة ب}$$

$$\mathcal{W}_{n+1} = -\frac{2^{n+1}}{e^2} + (n+1)\mathcal{W}_n \quad \text{أحسب } \mathcal{W}_1 \text{ ثم بين أن } (1 \leq n)$$

أستنتج  $\mathcal{W}_1$  و  $\mathcal{W}_2$

لتكن الدالة  $g$  المعرفة كما يلي  $g(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$  على المجال  $]0, +\infty[$

أوجد حجم الجسم المولد عن دوران منحنى الدالة  $g$  حول حامل محور الفواصل في المجال

$$x \in [1, e^2]$$

الموضوع الثالث

التمرين الأول (4ن) أجب عن الأسئلة الآتية المستقلة عن بعضها البعض

(1) أوجد ثلاثة أعداد حقيقية  $a$  و  $b$  و  $c$  بحيث

$$\frac{x^2}{(x-1)^2} = a + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2}$$

احسب القيمة المتوسطة للدالة  $h(x) = \frac{x^2}{(x-1)^2}$  في المجال  $[0, -3]$


(2) لتكن المتتالية  $(\omega_n)$  المعرفة بجددها العام كما يلي

$$\omega_n = \frac{11}{2} + \frac{-5n}{2}$$

برهن بالتراجع من اجل كل عدد طبيعي غير معدوم صحة المساواة

$$\omega_1 + 2\omega_2 + 3\omega_3 + \dots + n\omega_n = \frac{1}{6}n(n+1)(14-5n)$$

(3) اثبت ان المتتالية  $(u_n)$  للمساحات كما في الشكل أدناه هي متتالية حسابية اوجد عبارة حددها العام والحد  $u_{100}$



التمرين الثاني (5ن)

(1) نعتبر الدالة  $\varphi$  المعرفة على  $]0, +\infty[$  كما يلي  $\varphi(x) = \frac{x^2-1}{4} - 2\ln x$

ادرس تغيرات الدالة  $\varphi$

برهن أن للمعادلة  $\varphi(x) = 0$  حلا وحيدا  $\alpha$  حيث  $3 < \alpha < 4$  ثم انشئ  $(C_\varphi)$

(2) نعتبر الدالة  $\mu$  المعرفة على  $[3, +\infty[$  كما يلي  $\mu(x) = \sqrt{1 + 8\ln x}$

برهن أن المعادلة  $\varphi(x) = 0$  تكافئ المعادلة  $\mu(x) = x$

برهن أن  $\varphi(x) \geq 3$  و ان  $0 < \varphi'(x) \leq \frac{4}{9}$

(3) نعتبر المتتالية  $(\zeta_n)$  المعرفة كما يلي  $\begin{cases} \zeta_0 = 3 \\ \zeta_{n+1} = \mu(\zeta_n) \end{cases}$

برهن بالتراجع أن  $\zeta_n \geq 3$

باستعمال التكامل برهن أن  $0 < \zeta_{n+1} - \alpha \leq \frac{4}{9}(\zeta_n - \alpha)$

ثم استنتج  $\lim_{n \rightarrow \infty} \zeta_n$  من العبارة الاخيرة اوجد حصرا احد طرفيه  $\left(\frac{4}{9}\right)^n$

### التمرين الثالث (5ن)

يحتوي كيس على 3 كرات بيضاء ، كرتين صفراوين وكرتين حمراوين. نسحب كرتين على التوالي (بدون إرجاع).

$X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكرات البيضاء المسحوبة و  $Y$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكرات الصفراء المسحوبة.

(1) عين القيم الممكنة ل  $X$  .

(2) عين قانون احتمال المتغير  $X$  .

(3) احسب الأمل الرياضي والتباين للمتغير  $X$  .

(4) أجب عن نفس الأسئلة السابقة بالنسبة للمتغير  $Y$  .

(5) نعتبر المتغير العشوائي  $Z$  حيث  $Z = X + Y$  ، وليكن  $N$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكرات الحمراء المسحوبة.

• عبر عن  $Z$  بدلالة  $N$  . • استنتج قانون احتمال  $Z$  .

• احسب  $E(Z)$  الأمل الرياضي ل  $Z$  و  $\sigma(Z)$  تباين  $Z$  .

### التمرين الرابع (6ن)

المستوي منسوب إلى معلم متعامد  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .

لتكن الدالة  $f$  المعرفة على  $[0; +\infty[$  كما يلي:

$$f(x) = e^{-x} \cos(4x)$$



الشكل ادناه هو تمثيلها البياني  $\Gamma$  في المعلم  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على  $[0; +\infty[$  بـ  $g(x) = e^{-x}$

و نرمز بـ  $C$  إلى تمثيلها البياني في المعلم  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1. أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من  $[0; +\infty[$ :

$$-e^{-x} \leq f(x) \leq e^{-x}$$

ب- استنتج نهاية  $f$  عند  $+\infty$ .

2. عين إحداثيات نقط تقاطع المنحنيين  $\Gamma$  و  $C$ .

3. نعرف المتتالية  $(u_n)$  على  $\mathbb{N}$  بـ  $u_n = f\left(n\frac{\pi}{2}\right)$

أ- بين أن المتتالية  $(u_n)$  هندسية يطلب تعيين أساسها.

ب- استنتج اتجاه تغير المتتالية  $(u_n)$  و ادرس تقاربها.

4. أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من  $[0; +\infty[$ :

$$f'(x) = e^{-x} [\cos(4x) + 4\sin(4x)]$$


ب- استنتج أن المنحنيين  $\Gamma$  و  $C$  لهما نفس المماس عند كل نقطة من نقط تقاطعهما.

5. أعط قيمة مقربة إلى  $10^{-1}$  لمعامل توجيه المماس  $T$

للمنحني  $\Gamma$  عند النقطة التي فاصلتها  $\frac{\pi}{2}$

• أتم الشكل السابق برسم المماس  $T$  و المنحني  $C$ .

اوجد مساحة الحيز المحدد بـ  $\Gamma$  و  $C$  في المجال  $[0; 1; 5]$



عن الأستاذ لعلاونة علي