

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: 05 نقاط

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + \frac{5}{3} \end{cases}$$

1. أ) برهن بالترافق أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n < \frac{5}{2}$.

ب) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ، ثم استنتج أنها متقاربة.

2. أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $\frac{5}{2} - u_{n+1} = \frac{1}{3}\left(\frac{5}{2} - u_n\right)$.

ب) استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي n بدلالة u_n عبارة $\frac{5}{2} - u_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n \left(\frac{5}{2} - u_0\right)$.

واحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = \ln(u_{n+1} - u_n)$.

أ. بين أن (v_n) متتالية حسابية أساسها 3 يطلب حساب حدتها الأولى، ثم اكتب v_n بدلالة n .

ب. احسب بدلالة n الجداء P_n بحيث: $P_n = (u_1 - u_0) \times (u_2 - u_1) \times \dots \times (u_{n+1} - u_n)$.

التمرين الثاني: 04 نقاط

يحتوي كيس على 8 كريات متماثلة منها 6 كريات بيضاء مرقمة بـ 0,2,2,2,4 و 2 كريتين سوداين مرقمتين بـ 0,1.

نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاثة كريات من هذا الكيس ونعتبر الحدين A و B بحيث: الحدث A : الحصول على ثلاثة كريات مختلفة اللون والحدث B : الحصول على ثلاثة كريات مجموع أرقامها يساوي 4.

1. احسب كلا من $P(A)$ و $P(B)$ احتمالي الحدين A و B على الترتيب.

2. بين أن $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$, ثم استنتاج $P(A \cup B)$.

3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة عملية سحب أصغر الأرقام المحصل عليها أو يساوتها. عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$.

4. نسحب الآن عشوائيا n كريات على التوالي بالإرجاع بحيث $\begin{cases} n \in \mathbb{N} \\ n \geq 2 \end{cases}$ ونسمى C الحدث : الحصول على n كريات سوداء.

✓ بين أن $P(C) = \left(\frac{1}{4}\right)^n$, ثم أوجد أصغر قيمة للعدد الطبيعي n التي من أجلها يكون $P(C) \geq 0,99$.

التمرين الثالث: 04 نقاط

- نعتبر المعادلة (E) ذات المجهول الصحيح $(x; y)$ حيث $2x - 5y = 1$.
 1. أ) جد الحل $(x_0; y_0)$ للمعادلة (E) بحيث $x_0 = 3y_0$, ثم حل في \mathbb{Z}^2 المعادلة (E) .
 ب) بين أنه إذا كانت الثنائية $(x; y)$ حلاً للمعادلة (E) فإن الكسر $\frac{x}{y}$ غير قابل للاختزال.
 2. جد قيم العدد الطبيعي λ التي تتحقق $\begin{cases} \lambda \equiv 1962[5] \\ \lambda \equiv 2023[2] \end{cases}$ على 10.
 3. عين الثنائيات الطبيعية $(x; y)$ حلول المعادلة (E) والتي تتحقق $10^x + x + y \equiv 0[11]$.
 4. ليكن N عدداً طبيعياً يكتب $\overline{23}$ في النظام ذي الأساس α ويكتب $\overline{54}$ في النظام ذي الأساس β بحيث α و β عدادان طبيعيان.
 ✓ جد العددين α و β علماً أن $\alpha = 31 - \beta^2$, ثم اكتب N في النظام العشري.

التمرين الرابع: 07 نقاط

1. نعتبر الدالة g المعرفة والمترizada تماماً على \mathbb{R} بحيث $g(x) = e^x + x + 1$.
 2. بين أن المعادلة $0 = g(x)$ تقبل حلاً وحيداً α في \mathbb{R} , ثم تحقق أن $-1,29 < \alpha < -1,27$.
 2. استنتاج حسب قيمة x إشارة $g(x)$, ثم تتحقق أن $e^{-\alpha} = -\frac{1}{\alpha + 1}$.
 II. الدالة f معرفة على \mathbb{R} بـ $f(x) = 1 - x + \frac{x}{e^x + 1}$.
 المعلم المتعامد المتجانس $(o; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
 1. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 2. أ) بين أنه من أجل $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{-e^x g(x)}{(e^x + 1)^2}$, ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .
 ب) بين أن $f(\alpha) = -\alpha$, ثم استنتاج حصراً $f(\alpha)$.
 3. أ) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 1 - x$ مقابِل مائل لـ (C_f) عند $+ \infty$, ثم ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) .
 ب) بين أن $f'(-\alpha) = 0$, ثم اكتب معادلة اللمس (T) لـ (C_f) في النقطة ذات الفاصلة $-\alpha$.
 4. أنشئ المماس (T) والمستقيمات المقاربة, ثم مثل (C_f) .
 5. أ) بين أنه من أجل $x \in [0; 1]$: $f(x) \leq 1 - \frac{1}{2}x$, ثم استنتاج أنه من أجل $x \in [0; 1]$: $1 - x \leq f(x) \leq 1 - \frac{1}{2}x$.
 ب) استنتاج حصراً A مساحة العيّز المحدد بـ (C_f) ومحوري الأحداثيات والمستقيم ذو المعادلة $y = x$.

انتهى _____ إلى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول: 04 نقاط

نعتبر العددين الطبيعين a و b بحيث:

$$\begin{cases} a+b \equiv 7[11] \\ a-b \equiv 5[11] \end{cases}$$

1. أ) عين باقي القسمة الإقليدية للعدد $a^2 - b^2$ على العدد 11.
 ب) بين أن $a \equiv 6[11]$ ثم استنتج أن $b \equiv 1[11]$.

2. ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الإقليدية للعدد a^n على 11.

3. بين أن العدد A بحيث $A = a^{2023} + a^{1444} - (a-b)^{2021}$ مضاعف للعدد 11.

4. عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون $[11] \equiv b^{2973} + (a+b)n$.

التمرين الثاني: 05 نقاط

أ) جد العددين المركبين α و β بحيث:

$$\begin{cases} 2\bar{\alpha} - \sqrt{3}\beta = 3\sqrt{3} + i \\ \alpha i - \beta = 0 \end{cases}$$

ب) في المستوى المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o; \vec{u}, \vec{v})$ نعتبر النقط A , B و C التي لاحقاتها

$z_C = -1 + i\sqrt{3}$ و $z_B = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}z_A$, $z_A = \sqrt{3} + i$ على الترتيب.

1. اكتب z_B على الشكلين المثلثي والجبري، ثم استنتاج القيم المضبوطة له.

أ) عين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون $\left(\frac{z_B}{\sqrt{2}z_A}\right)^n$ تخلياً بحثاً سالباً تماماً.

ب) تحقق أن B صورة A بتحويل نقطي S يطلب تعين طبيعته وتحديد عناصره المميزة.

أ) بين أن $i = \frac{z_C}{z_A}$, ثم استنتاج طبيعة المثلث AOC .

ب) تتحقق أن $z_B - z_A = z_C$ ثم حدد بدقة طبيعة الرباعي $AOCB$.

4. عين طبيعة المجموعة (E) مجموعتا النقط (Z) بحيث $M(z_A)$ و $N(z_B)$ صورتها

$$\left| \frac{\bar{z} - \sqrt{3} + i}{\frac{\sqrt{2}}{2}iz} \right| = \left| \frac{z_B}{z_A} \right|$$

بالتحويل النقطي S .

التمرين الثالث: 04 نقاط

أ) نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ:

$$u_0 = 0$$

$$u_{n+1} = \left(\frac{1 + \sqrt{u_n}}{2} \right)^2$$

1. برهن بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $0 \leq u_n \leq 1$.

2. بين أنه من أجل $n \in \mathbb{N}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير المتالية (u_n) وبرر تقاربها.

. $v_n = \sqrt{u_n} - 1$ معرفة على \mathbb{N} بـ

1. أ) بين أن (v_n) متالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ يطلب حساب حدتها الأول.

. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)^2 : n \in \mathbb{N}$ ، ثم استنتاج أنه من أجل n ، اكتب v_n بدلاً عنه، ثم استنتاج أنه من أجل n .

2. احسب بدلاً عن n المجموع S_n بحيث $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

التمرين الرابع: 07 نقاط

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0; +\infty)$ بـ

$$f(x) = \ln\left(\frac{x^2 - 2x + 2}{x}\right)$$

ولتكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. أ) تحقق أنه من أجل $x > 0$

$$f(x) = \ln(x) + \ln\left(1 - \frac{2x - 2}{x^2}\right)$$

بـ احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \ln(x)]$ ، ثم فسر النتيجة بيانيًا.

ج) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Γ) المنحني الممثل للدالة.

3. بين أنه من أجل $x > 0$ ، ثم ادرس حسب قيمة x إشارة $f'(x)$ (لاحظ أن:

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2}{x(x^2 - 2x + 2)}$$

$x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1$ وشكل جدول تغيرات الدالة f .

أ) بين أن حل المعادلة $-1 = f'(x)$ يؤدي إلى حل المعادلة $0 = (x - 1)(x^2 + 2)$ ، ثم استنتاج أن (C_f) يقبل مماساً (T) معامل توجيهه -1 يطلب كتابة معادلته.

بـ عين أحداثيات نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

5. أنشئ (T) ومثل (Γ) ثم مثل (C_f) يعطى $f(\sqrt{2}) \approx -0,2$.

6. الدالة g معرفة على $[-2; 0] \cup [0; 2]$ بـ

$$g(x) = -\ln\left(\frac{x^2 - 2|x| + 2}{|x|}\right)$$

تمثيلها البياني في المستوى السابق.

أ) بين أن الدالة g زوجية.

بـ بـ بين أنه من أجل $x \in [0; 2]$ ، ثم استنتاج طريقة لرسم (C_g) انطلاقاً من (C_f) ورسمه.