

سلسلة البناء والتكوين: 2019/2020

كراسة الدوال الناقطة

تطبيقات القير المتوسط والاشتقاقية

موجهة لطلاب البكالوريا، رياضيات، ت ر

إعداد الأستاذ: جرادى سلطان

### التمرين الثاني:

الدالة  $f$  معرفة على  $R - \{1\}$  :-

$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + 1}{x - 1}$$

حيث  $a$  و  $b$  عددان حقيقيان.

الهدف من التمرين هو إيجاد إن أمكن  $a$  و  $b$  حيث يكون  $f(-1)$  قيمة حدية محلية عظمى معدومة .

1) لماذا  $f'(-1) = 0$  و  $f(-1) = 0$  ؟

2) أوجد إذن  $a$  و  $b$  ، ثم تحقق أن الدالة المحصل عليها تحقق الهدف .

### التمرين الثالث:

لتكن  $f$  دالة عددية لمتغير حقيقي غير معدوم  $x$

$$f(x) = \frac{-x^3 + x + 1}{x^2}$$

ولیکن  $(C_f)$  تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس .

1) عين العدد الحقيقي  $a$  بحيث من أجل كل عدد

$$f(x) = ax + \frac{x+1}{x^2}$$

2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  غير معدوم :

$$f'(x) = \frac{(x+1)(-x^2 + x - 2)}{x^3}$$

3) أدرس تغيرات الدالة  $f$

4) برهن أن المستقيم  $y = -x$  :مقارب للمنحني

$(C_f)$  ، ثم أدرس وضعية  $(C_f)$  و  $(\Delta)$

5) بين أن  $(C_f)$  يقطع حامل محور الفواصل في نقطة

فاصلتها  $\alpha$  حيث  $1 < \alpha < 2$

4)أرسم  $(C_f)$

### التمرين الأول:

الدالة  $g$  معرفة على المجالين  $]-\infty, 1[$  و  $]1, +\infty[$

كمايلي:  $g(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{(x-1)^2}$  ،  $(\Gamma)$  تمثيلها البياني في

المستوي المنسوب للمعلم المتعامد و المتجانس

$(O; \vec{i}, \vec{j})$  هل صحيح أم خاطئ ما يلي:


1- صيغة أخرى للدالة  $g$  هي:  $g(x) = 1 + \frac{1}{(x-1)^2}$

2- المنحني  $(\Gamma)$  يقبل مقاربتين

3- للمنحني  $(\Gamma)$  محور تناظر معادلة له:  $x = 1$

4- الدالة  $g$  متزايدة على المجال  $]1, +\infty[$

5- تمثيل  $(\Gamma)$  هو المقابل في الشكل التالي:



### التمرين الرابع:

$f$  دالة قابلة للاشتقاق على كل من المجالين  $]-\infty; -1[$  و  $]-1; +\infty[$  جدول تغيراتها هو التالي :

$x$	-1	0	$+\infty$
			$-\infty$
$f(x)$	1	0	5
			$+\infty$

(C) هو منحنى  $f$  في معلم  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

أكد صحة أو خطأ كل عبارة من العبارات الآتية مع التبرير:

- 1) الدالة  $f$  فردية .
- 2) المنحنى (C) يقبل مستقيمين مقاربين فقط .
- 3) من أجل كل  $x$  من  $\mathbb{R} - \{-1\}$  فإن :  $f(x) > 0$  .
- 4) المعادلة  $f(x) = 5$  تقبل حلين متمايزين في المجال  $]-1; +\infty[$  .
- 5) في المجال  $]-\infty; -1[$  ؛ (C) يقطع المستقيم (D) الذي  $y = 2$  معادلة له في نقطة وحيدة .
6. المنحنى (C) يقبل في النقطة ذات الفاصلة (-2) مماسا موازيا للمستقيم ( $\Delta$ ) الذي  $y = x$  معادلة له .
7.  $f(1) < f\left(\frac{3}{4}\right)$  .
8.  $g$  الدالة المعرفة على المجال  $]-\infty; -1[$  كما يلي :

$$g(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 2 \quad (أ)$$

(ب) الدالة  $g$  متزايدة تماما على المجال  $]-\infty; -1[$  .

9.  $h$  الدالة المعرفة على المجموعة  $\mathbb{R}^*$  كما يلي :

$$h(x) = \begin{cases} \frac{1}{f(x)}; x \neq -1 \\ h(-1) = 1 \end{cases}$$

- الدالة  $h$  مستمرة عند العدد (-1) .

### التمرين الخامس:

$f_1$  الدالة العددية المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي :

$$f(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

(C) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  .

1) أ- ادرس تغيرات الدالة  $f$  .

ب- اكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C) في النقطة ذات الفاصلة 0 .

ج- احسب  $f(-x) + f(x)$  من أجل كل عدد حقيقي  $x$  . وفسر النتيجة بيانيا ؟ .

هـ - بين أن المعادلة  $f(x) = x$  تقبل ؛ في المجال ؛

[1; 2] حلا وحيدا  $\alpha$  . فسر النتيجة بيانيا

و- مثل المنحنى (C) .

2)  $g$  الدالة العددية المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي :

$$g(x) = 1 + \frac{|x|}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

أ- ادرس قابلية اشتقاق  $g$  عند القيمة 0 . فسر النتيجة هندسيا .

ب- بين أن الدالة  $g$  زوجية .

ج- انطلاقا من (C) ارسم ( $C'$ ) منحنى الدالة  $g$  في المعلم  $(O; \vec{i}; \vec{j})$

### التمرين السادس:

•  $f$  الدالة المعرفة على المجال  $]-1; +\infty[$  كما يلي :

$$f(x) = \frac{3x + \sin x}{x - 1}$$

1) بين أن : من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]-1; +\infty[$  ؛

$$|f(x) - 3| \leq \frac{4}{x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \quad \text{استنتج}$$

### التمرين السابع:

$f$  دالة عددية قابلة للاشتقاق على كل مجال من مجموعة تعريفها لها جدول التغيرات التالي :

$x$	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+
$f(x)$						

تكتب العبارة  $f(x)$  على الشكل :

$f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$  حيث  $a, b, c$  أعداد حقيقية

1) احسب  $f'(x)$ .

2) اعتمادا على جدول تغيرات الدالة  $f$ :

عين الأعداد الحقيقية  $a, b, c$ .

### التمرين الثامن:

لتكن الدالة  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ :

$$g(x) = -x^3 + 6x^2 - 13x + 8$$

1/ أدرس تغيرات الدالة  $g$  ثم استنتج إشارة  $g(x)$

لاحظ أن  $g(1) = 0$

2/ لتكن الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R} - \{2\}$  بـ :

$$f(x) = -x + 1 + \frac{x-1}{(x-2)^2}$$

منحنى  $f$  في المستوى المنسوب للمعلم المتعامد  $(o, \vec{i}, \vec{j})$

$$\|\vec{j}\| = 3cm; \|\vec{i}\| = 2cm$$

أ) أحسب المشتقة  $f'(x)$  ثم تحقق أنه من أجل كل  $x$  من

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x-2)^3} : \mathbb{R} - \{2\}$$

ب) أستنتج إشارة  $f'(x)$

ج) شكل جدول تغيرات  $f$

3) بين أن  $(c_f)$  يقبل مستقيمين مقاربين  $(\Delta)$  و  $(D)$

حيث  $(\Delta)$  هو المستقيم المقارب المائل

4) أدرس وضعية  $(c_f)$  بالنسبة لـ  $(\Delta)$

5) أكتب معادلة لـ  $(T)$  مماس  $(c_f)$  في النقطة ذات الفاصلة 3

6/ أرسم  $(\Delta); (D); (T); (c_f)$ .

### التمرين التاسع:

نعرف الدالة  $f$  على المجالين:  $]-\infty, -1[$  و  $]-1, +\infty[$  كما يلي:

$$f(x) = 3x - 1 - \frac{x-1}{(x+1)^2}$$

وليكن  $(c_f)$  منحنى الدالة  $f$  في معلم متعامد متجانس

$(O; \vec{i}, \vec{j})$  (الوحدة  $2cm$ )

1) أدرس نهايات  $f$  عند حدود مجالي تعريفها

2) بين أن  $(c_f)$  يقبل مقاربين أحدهما مائل  $(\Delta)$  يطلب تعيين

معادلة له.

3) بين أن  $(c_f)$  يشترك مع مقاربه المائل في نقطة يطلب

نعين إحداثيها، ثم حدد وضعية  $(c_f)$  مع  $(\Delta)$

4) عين نقط تقاطع  $(c_f)$  مع المستقيمين المعرفين

$$\text{بمعادلتيهما: } y=2, y=0$$

5) تحقق أن الدالة المشتقة للدالة  $f$  معرفة كما يلي

$$f'(x) = \frac{xp(x)}{(x+1)^3} \text{ حيث } p(x) \text{ كثير حدود من الدرجة}$$

الثانية

6) أدرس إتجاه تغير الدالة  $f$  ثم ارسم  $(c_f)$  أرسم  $(c_f)$

$$\begin{cases} f(x) = x^2 + x - 3 & ; x \in [1; +\infty[ \\ f(x) = \dots & ; x \in ]-\infty; 1[ \end{cases}$$

اقترح عبارة لـ  $f(x)$  على المجال  $] -\infty; 1[$  حتى تكون الدالة  $f$  مستمرة على  $\mathbb{R}$ .

### التمرين الثالث عشر:

أوجد مايلي:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi x - 1}{2x}\right), \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{x+4}{x^2-3}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\pi \frac{\sin x}{x}\right), \lim_{x \rightarrow -1} \sin\left(-\frac{\pi}{2}x\right) + \frac{1}{(x+1)^2}$$

### التمرين الرابع عشر:

لدينا  $n$  من الأعداد الحقيقية المختلفة مثنى- مثنى:

$$a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_n \text{ حيث } a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$$

نعرف الدالة العددية  $f$  من أجل كل عدد حقيقي  $x$  كما يلي:

$$f(x) = \frac{1}{x-a_1} + \frac{1}{x-a_2} + \dots + \frac{1}{x-a_n}$$

$$\text{حيث: } x \neq a_i; i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$$

(1) أدرس إتجاه تغير الدالة

(2) شكل جدول تغيرات الدالة  $f$

(3) ما هو عدد حلول المعادلة:  $f(x) = 2010$

### التمرين الخامس عشر:

$f$  هي الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  كما يلي:

$$f(x) = 3x^3 - 2x - \frac{1}{4}$$

1) احسب  $f(1)$ ,  $f(0)$ ,  $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ ,  $f(-1)$

2) استنتج أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل ثلاثة حلول في المجال  $[-1; 1]$

### التمرين العاشر:

التمرين الأول:

لتكن الدالة  $f$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  بـ :

$$f(x) = x - \frac{1}{2} \cos x$$

أ / برهن أنه من أجل كل من  $x$  المجال  $]0; +\infty[$  لدينا :

$$x - \frac{1}{2} \leq f(x) \leq x + \frac{1}{2}$$

ب / استنتج  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

2 / أثبت أن الدالة  $f$  متزايدة تماما على المجال  $]0; +\infty[$ .

ب / أثبت أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا  $\alpha$  في

المجال  $]0; +\infty[$  وأن  $0 < \alpha < \frac{\pi}{6}$ .

ج / عين إشارة  $f(x)$  من أجل كل  $x$  من  $]0; +\infty[$ .

### التمرين الحادي عشر:

$f$  هي الدالة المعرفة على  $]2; +\infty[ \cup ]-\infty; -2[$

$$f(x) = x + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}}$$

و (C) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم .

1) بين أن الدالة  $f$  فردية

2) احسب نهايات الدالة  $f$  عند أطراف مجموعة التعريف.

3) بين أن المستقيم  $\Delta$  الذي معادله  $y = x + 1$  مقارب للمنحني (C) عند  $+\infty$ . حدد وضعية (C) بالنسبة لـ  $\Delta$

4) باستعمال نتيجة السؤال 1) استنتج أن المنحني (C) يقبل مستقيما مقاربا مائلا عند  $-\infty$  يطلب تعيين معادلة له.

5) ليكن (C') التمثيل البياني للدالة  $g$  المعرفة على

$$]2; +\infty[ \cup ]-\infty; -2[ \text{ بـ } g(x) = -f(x)$$

• عين المستقيمات المقاربة للمنحني (C').

### التمرين الثاني عشر:

$f$  هي الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:

التمرين السادس عشر:

الدالة  $f$  معرفة على  $\mathbb{R}$  كمايلي:  $f(x) = \frac{x^3}{x^2+3x+3}$  ونسمي

(c) التمثيل البياني للدالة  $f$  في المستوي المزود با معلم المتعامد المتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1) احسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

2) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  فإن:

$$f(x) = x - 3 + \frac{6x+9}{x^2+3x+3}$$

3) إستنتج معادلة للمقارب المائل ثم أدرس وضعية  $(\Delta)$  مع (c)

4) احسب عبارة المشتقة  $f'(x)$  مبينا أنها تحقق العلاقة:

$$f'(x) = \frac{x^2(x+3)^2}{(x^2+3x+3)^2}$$

5) إستنتج جدول تغيرات الدالة  $f$

6) برر أن النقطتين  $O(0,0)$  و  $A(-3,-9)$  هما نقطتا إنعطاف

للمنحني (c)

7) أرسم  $(\Delta)$  و (c)

8) الدالة  $g$  معرفة على  $\mathbb{R}$  بالدستور:  $g(x) = \frac{|x|x^2}{x^2+3|x|+3}$

( $\gamma$ ) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أبين أن الدالة  $g$  زوجية .

ب) أرسم مع الشرح المنحني ( $\gamma$ ) في نفس الشكل.

التمرين السابع عشر:

الدالة العددية المعرفة على  $R$  كما يلي:  $f(x) = \frac{x^3+9x}{2(x^2+1)}$

(1) عين العددين الحقيقيين  $a, b$  بحيث لكل عدد حقيقي  $x$

$$f(x) = ax + \frac{bx}{x^2+1}$$

(2) أدرس إتجاه تغير الدالة  $f$

(3) ضع جدول تغيرات الدالة  $f$

4) أثبت أن  $(c_f)$  منحنى الدالة  $f$  في معلم متعامد متجانس

$(O; \vec{i}, \vec{j})$  يقبل مقاربا مائلا  $(\Delta)$

5) بين أن  $(c_f)$  يقبل مركز تناظر يطلب تعيينه.

6) أرسم  $(c_f)$

7) بين أن  $(c_f)$  يقبل مماسين يوازيان  $(\Delta)$  وعين معادلتين لهما.

8) ناقش تبعا لقيم الوسيط الحقيقي  $m$  عدد نقط تقاطع  $(c_f)$  مع

$$y = \frac{1}{2}x + m$$

التمرين الثامن عشر:

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  كمايلي:

$$f(x) = x + \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

المستوي المزود با معلم المتعامد المتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  فإن:

$$f(-x) + f(x) = 0$$

وبالنسبة لتمثيلها البياني؟

2) أوجد:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  حسابيا واستنتج:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

3) أحسب:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+1)]$ ، واستنتج وجود مقارب

مائلا للمنحني (c) عند  $+\infty$

4) إستنتج معادلة المقارب المائل الثاني للمنحني (c) عند  $-\infty$

5) أدرس إتجاه تغيرات الدالة  $f$  على المجال  $[0, +\infty[$  ثم ضع

جدول تغيراتها على  $\mathbb{R}$  .

6) أرسم (c) ومقاربيه.